



01_Divočejší partie parku slouží jako biotop pro křovinné druhy ptáků, např. červenku obecnou



02_Housenka otakárka fenyklového (*Papilio machaon*) na fenyklu



03_Na budce pro netopýry je znatelný trus indikující výskyt netopýrů



04_Park je sečený intenzivně v celé ploše, chybí květnaté partie s extenzivním kosením



05_Právě vylétlé mládě rehka domácího (*Phoenicurus ochruros*) na okraji parku



06_Torzo jilmu vaz sloužící jako potravní stanoviště šplhavců, brhlíka lesního a šoupálka krátkoprstého



07_Ukázka květnaté, nekosené plochy na hlavní třídě před parkem



08_Dřevocementové budky pro netopýry umístěné na stromech v parku



09_Typický hnízdní biotop sedmihláska hajního (*Hippolais icterina*)



10_ *Eupatorium cannabinum* v ploše 2, nejspíš jeden z mála náznaků podmáčeného stanoviště



11_exponovaný a proschlý západní okraj parku, plocha 13



12_hájový charakter porostu s *Polygonatum multiflorum*, plocha 2



13_hodnotná torza jilmů v ploše 23



14_nevhodné dosadby jehličnanů v okolí zámku



15_plocha 1 z interiéru porostu, husté pajasanové výmladky



16_polykormon křídlatky japonské v ploše 21



17_rozsáhlý klon pajasanu v ploše 1



18_úpatí stěny s Arundo donax, plocha 7